



TECNOMEDICINA

Assistenza a distanza

Aziende e soluzioni

Diagnostica e analisi

Fiere ed eventi

Internet e mobile

Medicina e chirurgia

Piattaforme IT e TLC

Ricerca e università

Sanità e presidi



Consiglio
Nazionale delle
Ricerche

SET
19
2018

Diabete in gravidanza: la metformina aumenta il rischio di anomalie congenite

Redazione Ricerca e università

L'Istituto di fisiologia clinica del [Consiglio nazionale delle ricerche](#) di Pisa, in collaborazione con la Fondazione toscana Gabriele Monasterio, ha fornito nuove prove sulla sicurezza legata all'uso della metformina nel diabete gestazionale durante il primo trimestre di gravidanza. Lo studio, recentemente pubblicato su "British medical journal", ha analizzato un numero di donne in gravidanza esposte alla metformina 5 volte maggiore di quanto non fosse stato documentato prima in letteratura. "Sono state osservate quasi 1,9 milioni di nascite in Europa, fra il 2006 e il 2013, utilizzando i dati di 11 registri di anomalie congenite di 9 nazioni europee. Nello specifico, sono stati rilevati 50.167 bambini affetti da anomalie congenite tra nati vivi, morti fetali e interruzioni di gravidanza a seguito di diagnosi prenatale di anomalie", spiega Anna Pierini, ricercatrice del [Cnr-Ifc](#). "Sui 50.167 casi analizzati abbiamo riscontrato 168 casi di anomalie congenite esposti a metformina, pari a 3,3 per 1.000 nati. Non è emersa alcuna evidenza di aumento del rischio per tutte le anomalie congenite maggiori a seguito dell'assunzione di metformina nel primo trimestre di gravidanza, per diabete o altre indicazioni".

L'unico eccesso evidenziato è quello relativo all'atresia della valvola polmonare, un difetto cardiaco registrato in 3 casi esposti a metformina su 229 casi totali. "Tra i tre casi, una mamma aveva il diabete pregestazionale e altre due mamme avevano assunto induttori dell'ovulazione", prosegue Pierini. "Nonostante la necessità di ulteriore sorveglianza per aumentare la dimensione del campione e per il follow-up del segnale cardiaco emerso dallo studio, questi risultati sono rassicuranti, considerando che l'uso di metformina in gravidanza risulta in aumento e che la presenza di diabete pregestazionale raddoppia il rischio di anomalie congenite".

Il diabete gestazionale è un'intolleranza al glucosio legata alla gravidanza che generalmente regredisce dopo il parto, e che "in Europa ha una prevalenza del 7-8% delle gravidanze, percentuale in crescita a causa dell'aumento dell'età materna alla gestazione e del peso pre-gravidico", avverte la ricercatrice del [Cnr-Ifc](#). "In quanto al trattamento la prima cura resta la dieta e se questa non è sufficiente, bisogna far ricorso all'insulina. Nessun altro farmaco,

Print PDF

A A A A A A

News in primo piano

Scoperti centinaia di marcatori genetici legati alla pressione sanguigna



e 500 nuove regioni geniche che lenzano la pressione sanguigna ...

Visita il sito della trasmissione TV

informatv

Traduci



Archivio articoli

Archivio articoli

Seleziona mese

Ultime news

19 Set Cancro e inquinamento: Italia maglia nera per i tuoi tumori infantili

19 Set Disturbi del sonno per 9 donne su 10 over 45

compresa la metformina, ha come indicazione terapeutica il diabete gestazionale". La metformina attraversa la placenta umana, esponendo il feto a concentrazioni prossime a quelle della circolazione materna.

"L'obiettivo dello studio è stato quello di valutare se l'assunzione di metformina nel primo trimestre di gravidanza comporti rischi di difetti alla nascita, considerando che in letteratura esistono pochi studi finalizzati ad accertare il tasso di anomalie congenite dovute all'uso del farmaco durante la gestazione", conclude Pierini. "La metformina viene prescritta anche nella sindrome dell'ovaio policistico, così come per la riduzione di peso nell'obesità non diabetica, per normalizzare il ciclo mestruale o per favorire il concepimento. L'aumento delle prescrizioni ha generato una crescita del rischio di esposizioni involontarie a metformina. Data l'elevata percentuale di gravidanze non programmate, le donne potrebbero essere esposte al farmaco anche senza essere a conoscenza del concepimento".

Lo studio è stato realizzato nell'ambito di EUROMediCAT, consorzio di ricerca europeo dedicato al miglioramento della sicurezza dei farmaci in gravidanza, con lo scopo di costruire un network che valuti il profilo delle molecole in relazione al rischio di anomalie congenite all'interno di EUROCAT, la rete europea di registri per la sorveglianza delle anomalie congenite che copre oltre 1,5 milioni di nascite l'anno in 20 paesi d'Europa.

Articoli correlati:

1. All'ospedale Sant'Anna di Torino un nuovo test del DNA fetale per lo screening prenatale
2. Cresce la prevenzione della 'Farmacia dei Servizi'
3. Il test di gravidanza precoce su sangue intero FIRST TO KNOW di NOW Diagnostics disponibile in Italia

Condividi 

Ultima modifica:09/19/18

anomalie • [Cnr](#) • congenite • diabete • gravidanza • metformina

◀ Cancro e inquinamento: Italia maglia nera per i tuoi tumori infantili
Panasonic presenta a ESCRS Vienna la tecnologia 4K per l'oftalmologia ▶

18 Set 175 milioni di europei soffrono di apnea notturna

Mercato Biomed

L'Institut Curie annuncia la creazione di Honing Biosciences

Mondo Sanità

Dei tre milioni di anziani non autosufficienti in Italia solo la metà è coperta da servizi sociosanitari

Comunicazione e prevenzione

Progetto "Farmacia dei Servizi" partono altre iniziative di prevenzione


Cerca articoli scientifici in PubMed

+ Advanced

Reset

Search

Tecnomedicina 2.0



Seguici su Facebook



Tecnomedicina
463 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Condividi

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

La playlist di Tecnomedicina



Scarica l'ultimo numero della rivista Pianeta Salute